



Farmatan

ФАРМАТАН
СТОП ДІАРЕЯ!



tekro

ФАРМАТАН — лінійка натуральних засобів рослинного походження для здоров'я кишківника тварин.
Безпечна та вигідна альтернатива антибіотикам!

FARMATAN – це лінійка натуральних лікувальних засобів для лікування та профілактики діареї, створена на основі танінів, видобутих із ретельно відібраної деревини солодкого каштану (*Castanea sativa*).

FARMATAN - це натуральна і дієва заміна антибіотикам.


Науково доведено: **FARMATAN** зменшує мікробне навантаження, стабілізує процес травлення, а також підвищує рівень імунітету та загальний стан здоров'я багатьох видів тварин.

Таніни FARMATAN – це чисті галові та елагові таніни у вигляді пудри органічного походження, отримані шляхом екстракції з плодів каштану різної ступені обпалення за запатентованою технологією “Sevnica”.

Особливість танінів Sevnica - сильновиражений антибактеріальний ефект!




ПРИНЦИП дії FARMATAN



FARMATAN оберігає шлунково-кишковий тракт, захищаючи слизову оболонку від мікробної колонізації та запобігаючи вивільненню мікробних токсинів. Доведено, що **FARMATAN** запобігає росту патогенних мікроорганізмів, їх прикріпленню, а також зв'язуючись із муцинами слизової оболонки кишечника, формує захисний шар, укріплює міжклітинні зв'язки.

Напрямки дії FARMATAN




Коли застосовувати FARMATAN:

<p>У стресових умовах: відлучення, незадовільна якість повітря, некомфортна температура, погані гігієнічні умови.</p>	<p>При діарейі: в тому числі за кокцидіозу, криптоспоридіозу та клостридіозу; для запобігання здуттю та для зменшення водянистих виділень.</p>	<p>Для підвищення продуктивності: збільшення приростів, надоїв, а також поліпшення кількості соматичних клітин в молоці та ін.</p>	<p>Для підвищення імунітету місцевого (кишечника) та загального (всього організму), покращення виживаності поголів'я.</p>
--	---	---	--

Лінійка засобів FARMATAN

Види						
FARMATAN CP	✓		✓	✓	✓	
FARMATAN BCO		✓				
FARMATAN GEL	✓		✓	✓	✓	
FARMATAN DSO	✓					
FARMATAN LIQUID	✓	✓	✓			
SAPOTAN Powder	✓	✓				✓
FIBER G	✓					

Спектр дії FARMATAN



E.coli




Salmonella



**Clostridium
perfringens**




Lawsonia



Brachyspira



Coccidia



Cryptosporidia



Концентрований засіб на основі гідролізованих танінів каштана, збагачений галовою та елаговою кислотами, створений для стабілізації травлення та підтримки здоров'я молодняка жуйних і свиней.

Форма випуску	Порошок
Особливості складу	Галова та елагова кислоти, що мають сильну антибактеріальну дію.
Дія	<ul style="list-style-type: none"> • Профілактика і лікування бактеріальних інфекцій та діареї різної природи, в тому числі E. coli, Clostridium spp, Salmonella spp. • Підтримка імунної відповіді - зменшує запалення в кишечнику та сприяє природному захисту. • Протидія патогенним бактеріям: стримує їх ріст, перешкоджає прикріпленню до слизової. • Підтримка травлення, всмоктування та засвоєння поживних речовин.
Вид тварин	Телята, ягнята, козенята, поросята
Вік	З 3-5 дня життя
Пакування	Мішки по 15 кг

Дозування:

- У стресових умовах (переведення, вакцинація): 3–5 г / теля / добу протягом 3–5 днів, можна використовувати 2-3 рази на день.
- При діареї, лікуванні кокцидіозу та криптоспоридіозу - 10 г на теля на день з 2-го по 30-й день життя.
- Профілактично телятам, ягням та козенятам: 4-8 г на голову на день з 2-го дня життя протягом усього ризикового періоду (5-7 днів), що еквівалентно 4-5 кг / т молочного замітника.
- Свині: 0,5-2,5 кг/т корму

Спосіб застосування: Змішати з молоком / ЗЦМ або з невеликою кількістю води до пастоподібного стану.
Забезпечити доступ до води.

Показник	Лікування без Farmatan	З Farmatan (з досвіду ферм)
Частота діареї	25–30% телят	10–15%
Летальність	3–5%	1–2%
Середній приріст	+5%	+8–10%



Це спеціалізована кормова добавка для птиці, що забезпечує стабілізацію мікробіоти кишечника, підтримує високу продуктивність, підвищує стійкість організму до стресових факторів та сприяє здоровому росту птиці.

Фарматан VCO проявляє **антимікробну, протизапальну та антиоксидантну дію**, що робить його ефективним у профілактиці інфекцій, підтримці імунітету та покращенні процесів травлення. До складу входять природні рослинні екстракти з вираженими антиоксидантними властивостями, які також сприяють поліпшенню апетиту та загального стану птиці.

Форма випуску	Порошок
Особливості складу	Комбінація екстракту каштану солодкого, бутирату, а також лимонної, яблучної, мурашинної, молочної та фосфорної кислот, карвакролу, евгенолу, капсаїцину.
Дія	<ul style="list-style-type: none">• Профілактика і лікування бактеріальних інфекцій (клостридіозу, колибактеріозу, сальмонельозу, кокцидіозу) та діареї різної природи.• Підвищує якість яєчної продукції (менше брудного та битого яйця).• Стимулює ріст біфідо- та лактобактерій, створюючи оптимальний баланс мікробіоти ШКТ, завдяки чому покращується набір ваги.
Вид тварин	Несучка, бройлери, батьківське поголів'я птиці
Вік	Без обмежень
Пакування	Мішки по 25 кг

Використовується для підтримки здоров'я травної системи, забезпечення сухої та безпечної підстилки, профілактики дерматитів і уражень кінцівок, покращення засвоюваності корму, підвищення щоденних приростів та маси тіла, оптимізації конверсії і підсилення ефективності антикоксидіозної програми.

Можливе спільне використання з підкислювачами.

**Дозування з кормом:**

- птиця: 0,2 – 0,75 кг/т корму.

Коли використовувати:


БРОЙЛЕРИ

- Профілактика дисбактеріозу
- Для сухої підстилки
- Профілактика дерматиту лап
- Профілактика уражень суглобів
- Покращення засвоюваності корму
- Покращення щоденного приросту ваги
- Підвищення кінцевої маси тіла
- Для покращення конверсії корму
- Підтримка антикоксидіозної програми

НЕСУЧКА/БАТЬКІВСЬКЕ ПОГОЛІВ'Я

- Профілактика колібактеріозу та перитоніту
- Профілактика клостридіозу під час вирощування та на початку несучості
- Профілактика колонізації сальмонелою
- Профілактика дисбактеріозу та збільшення сухості підстилки/послїду
- Для чистіших яєць
- Покращення несучості
- Збільшення ваги яєць та класу яєць
- Для кращої якості шкаралупи
- Для покращення виводимості яєць
- Для профілактики виразок на лапах у самців

Рівень пошкоджень кишечника птиці за коксидіозу при використанні FARMATAN у програмі і без





Швидкодійний засіб для підтримки імунітету та стабілізації стану молодняка під час проносів. Завдяки особливому складу гель зміцнює щільні міжклітинні з'єднання у кишечнику, відновлює бар'єрну функцію та запобігає втраті рідини.

Форма випуску	Гель
Особливості складу	Склад збагачений елаготанінами та ефірними маслами, рослинним вугіллем і гліцеридами масляної кислоти.
Дія	<ul style="list-style-type: none"> ● Стабілізація стану молодняка під час діареї: швидко зменшує прояви проносу та підтримує енергетичний та водно-електролітний баланс. ● Відновлення бар'єрної функції кишечника, зміцнення щільних міжклітинних з'єднань та зниження проникності кишкової стінки. ● Підтримка імунної відповіді - зменшує запалення в кишечнику та сприяє природному захисту організму. ● Протидія патогенним бактеріям: стримує ріст патогенів, протидіє їх адгезії та сприяє відновленню здорової мікрофлори. ● Підтримка травлення та всмоктування поживних речовин: сприяє кращій роботі кишечника.
Вид тварин	Поросята, телята, ягнята, козенята
Вік	З 2-го дня життя
Пакування	Флакони по 250 мл та 1000 мл

Може застосовуватися кожні 12 годин як лікувальна підтримка або вводиться профілактично після випоювання молозива.

Дозування:

- телята - 8 мл.
- ягнята - 2 мл.
- козенята - 2 мл.
- поросята - 1 мл.






Ефективний засіб проти діареї, ілеїту та дизентерії у свиней. Унікальна комбінація елаготанінів, ефірних олій орегано та хелатуючого агента забезпечує потужну антимікробну дію проти широкого спектру патогенних мікроорганізмів, включно з антибіотикорезистентними штамми, підтримує баланс кишкової мікрофлори та стимулює відновлення та ріст епітелію кишківника.

Форма випуску	Мікрогранульований порошок
Особливості складу	Комбінація елаготанінів, ефірних олій орегано та хелатуючого агента.
Дія	<ul style="list-style-type: none">● Антимікробна дія — за рахунок елаготанінів та ефірних олій (орегано) активний проти більшості патогенів в тому числі E.coli, Clostridia, Salmonella, Brachyspira hyodysenteriae та Lawsonia intracellularis.● Гастропротекторна та протизапальна дія — елаготаніни забезпечують захист слизової оболонки кишечника.● Регенерація епітелію кишківника — покращує відновлення слизової і стимулює ріст ворсинок, кишечника.
Вид тварин	Поросята
Вік	Без обмежень
Пакування	Мішки по 25 кг

Дозування:

- свині (гровер) – 500-750 г/т корму
- свині (фініш) - 250-500 г/т корму



* ІП – інший продукт з аналогічною дією

ФАРМАТАН ДСО збільшує:

- Збереженість
- Прирости
- Покращує конверсію корму



Рідка кормова добавка для профілактики та лікування розладів шлунково-кишкового тракту, пов'язаних із запаленням або порушенням цілісності кишечника, а також для подолання станів енергодефіциту та прискорення відновлення організму.

Препарат містить комплекс компонентів, направлених на **відновлення, захист та розвиток слизової оболонки кишечника.**

Форма випуску	Розчин
Особливості складу	Комбінація екстракту каштану солодкого, лимонної кислоти, моно-, ди- і тригліцеридів масляної кислоти, гліцерину.
Дія	<ul style="list-style-type: none"> ● Антимікробна дія. ● Підвищення імунітету та зниження запалення. ● Захист слизової оболонки кишечника: попередження проникнення патогенів. ● Стимулювання росту та розвитку ворсинок кишечника: краще засвоєння поживних речовин.
Вид тварин	Птиця: бройлери, несучка, батьківське поголів'я. Телята, свині.
Вік	Без обмежень
Пакування	1 л

Дозування:

- **Птиця з профілактичною метою:**
 - ▶ 1 – 2 л /1000 л питної води 8-12 годин/день, 3-5 днів. Може використовуватися щотижня або спорадично, за потреби.
- **Птиця з лікувальною метою:**
 - ▶ у разі дисбактеріозу/клостридіозу: 2-3 л на 1000 л води, 8-10 годин, 5-7 днів.
 - ▶ у разі кокцидіозу: 3-3,5 мл/л води, 5-7 днів, 8-12 годин.
- **Телята:**
 - ▶ 3 – 5 л /1000 л питної води 8-12 годин/день, 3-5 днів.
Не використовувати з сирим молоком.
- **Свині:**
 - ▶ 1-3 л /1000 л питної води, 3-5 днів.

Щодня готуйте свіжий розчин. Перед першим використанням продукту необхідно очистити біоплівку у всій питній системі очисником або миючим засобом, що містить перекис водню, наприклад, Ванодокс або Перодокс.

ТЕКРОКЛІН - імпульсний прилад - відмінно впроваджується із задачею очищення водопровідної системи.

Не змішувати спільно з вітамінами та вакцинацією через воду!



Коли використовувати:


БРОЙЛЕРИ

- Висока щільність посадки
- Зневоднення через транспортування
- Низька вологість у пташниках
- Ризик коків, кишкової палички та сальмонели у курчат
- До або після зміни корму (стартер, гровер, фінішер)
- Якщо спостерігається нижчий добовий приріст ваги в будь-який період циклу
- Перед відбором проб на сальмонельоз
- Перед забоем для зниження тиску кишкової палички, сальмонели, кампілобактера та зменшення забруднення туш

НЕСУЧКА/БАТЬКІВСЬКЕ ПОГОЛІВ'Я

- Вирощування та початок несучості
- Підвищений ризик клостридіозу, кокцидіозу, колібактеріозу, сальпінгіту
- Неспецифічне збільшення споживання води
- За 3-5 днів до відбору проб
- Вологий послід та брудні яйця
- Зменшення кількості яєць I класу
- Линька
- Раптове та неспецифічне зниження виводимості

Результати використання ФАРМАТАН ЛІКВІД:



Гістологічні дослідження на бройлерах у віці 7 та 42 дні:

- на **26%** збільшення товщини шару ворсинок і на **18%** збільшення крипт на 7 день незалежно від дозування;
- на **28-31%** більша товщина м'язової пластини слизової оболонки та на **31-53%** більше товщина м'язової мембрани на 42 день.

Контрольна група отримувала основний раціон, дослідні групи 1 і 2 – ФАРМАТАН ЛІКВІД 1 і 2 мл/л води від 1 до 5 днів від 20-го до 24-го дня вирощування.



Це натуральне фітогенне рішення для зв'язування аміаку, поліпшення мікроклімату приміщення та підвищення продуктивності тварин. Засіб отриманий завдяки екстракції сапонінів зі спеціально відібраних частин дуба *Quercus robur*, а також підсилений додаванням юкки *Yucca schidigera*.

Завдяки високому вмісту тритерпеноїдних і стероїдних сапонінів ефективно знижує рівень аміаку.

Форма випуску	Порошок
Особливості складу	100% рослинний та безпечний засіб. Поєднує кілька рослинних компонентів з високим вмістом аміак-зв'язуючих речовин.
Дія	<ul style="list-style-type: none"> ● Гігієна ферми: до 30% зменшує рівень аміаку, покращує якість повітря та нейтралізує неприємний запах. ● Збереження здоров'я: знижує сприйнятливість до респіраторних інфекцій, покращує функцію кишечника, знижує інфекційний тиск. ● Покращення травлення: оптимізує споживання корму та забезпечує краще засвоєння поживних речовин. ● Підвищення продуктивності: покращує ріст та продуктивність.
Вид тварин	Свині, птиця, аквакультури (креветки, риба та ін.)
Вік	Для будь-якого віку
Пакування	Мішки по 15 кг

Дозування:

- **Свині, птиця:**
 - ▶ додають у сухі корми або премікси під час приготування з розрахунку 0,1–0,3 кг/т готового корму.
- **Аквакультури:**
 - ▶ препарат рекомендується для нанесення по площі в дозі від 1,5 - 2,5 кг на гектар.

! Для підбору дозування краще проконсультуватися із представником компанії ТЕКРО.

Результати використання*:

- До 30% скорочення вмісту аміаку в повітрі
- Збільшення живої ваги
- Збільшення споживання корму, а також покращення показник конверсії корму
- Збільшення ваги печінки, серця, підшлункової залози*

*Джерело: Maksimijan Brus. The use of tannin supplements in chicken diets to reduce NH₃ production in breeding. University of Maribor Faculty of Agriculture and Life Sciences, Slovenia



Клітковина з лікарськими властивостями для здоров'я кишечника та ситості, що нейтралізує хвороботворні бактерії, збільшує висоту ворсинок кишечника та посилює всмоктування поживних речовин.

Використовується для свиноматок та поросят для підтримки ефективного травлення та використання поживних речовин, особливо під час стресу. Підвищує смакові якості та ефективно зв'язує аміак.

Форма випуску	Подрібнені гранули
Особливості складу	FIBER G містить удосконалену клітковину: харчову лігноцелюлозу нового покоління з багатофункціональною дією. FIBER G багатий на поліфеноли, сапоніни та гліцериди жирних кислот, що виражається в багатофункціональній активності продукту.
Дія	<ul style="list-style-type: none">● Попередження діареї: протидія бактеріям <i>E.coli</i>, <i>C.perfringens</i>, нейтралізація бактеріальних токсинів.● Здоров'я кишечника: ріст ворсинок, підвищення засвоєння поживних речовин та ріст приростів.● Покращення родової діяльності свиноматок: скорочення часу опоросу, більше живонароджених поросят, запобігання ММА.● Антистресові та антиоксидантні властивості: посилює імунітет.● Зв'язування аміаку та скорочення викидів.
Вид тварин	Свиноматки, поросята
Вік	Без обмежень
Пакування	Мішки по 20 кг

Дозування:

- свиноматки - 1-3%,
- поросята - 0,5-2% до раціону.

Коли використовувати:

СВИНОМАТКАМ

- Для підтримання відчуття ситості та спокою
- Для зниження агресивної поведінки
- Для підвищення лактації
- Для покращення приростів поросят в підсисний період

ПОРΟΣЯТАМ

- Для пригнічення патогенних бактерій та профілактики діареї
- Для посилення імунітету та опірності організму
- Для покращення показників конверсії
- Для підвищення збереженості
- Для збільшення живої маси



Farmatan



tekro

TEKRO- коли є результат!

TEKRO.UA

0 800 503 112*
*дзвінки безкоштовні