



FeedStim®

ФідСтім

Збереження продуктивності птиці
від наслідків теплового стресу



tekro

ДЛЯ ПІДТРИМКИ КОМФОРТУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ У СПЕКУ

СКІЛЬКИ ВТРАЧАЄ ГОСПОДАРСТВО?



Середня маса тіла птиці, вирощеної впродовж 5 тижнів теплового стресу (при 35 °C), була:

на 300 г (-19%) нижчою,
ніж у контрольній групі.

Птиця, яка пережила тепловий стрес, також мала:

- меншу яйценоскість на -36%,
- меншу масу яєць на -16%
- гіршу якість шкаралупи до -30%.

ВПЛИВ ТЕПЛООВОГО СТРЕСУ НА БРОЙЛЕРІВ




УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ FEEDSTIM

ФідСтім – впорається із негативними наслідками теплового стресу у птиці, завдяки, інноваційній технології подвійної дії: рослинні екстракти *Scutellaria baicalensis* та куркуми + запатентована формула високоочищених мінеральних солей.



ДОВЕДЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НА НЕСУЧКАХ

Підвищення яйценоскості (%)




При проведенні 4-х польових досліджень **FeedStim** на несучках:


- ✓ +4,3% підвищення рівня несучості
- ✓ на 0,06 одиниць покращення конверсії корму
- ✓ від 3 до 9 – показник повернення інвестицій

ДОВЕДЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НА БРОЙЛЕРАХ

Збільшення приростів (г/день)



Покращення конверсії корму (од.)





FeedStim®

РІВЕНЬ СТРЕСУ У БРОЙЛЕРІВ ВІКОМ 3-4 ТИЖНІ

Температура до 24°C
та вологість 50%

25°C
60%

28°C
50%

33°C
70%

Норма

Легкий стрес

Важкий стрес

Надважкий стрес



Дихання:
15 – 35 / хвилину
Температура
тіла: 41°C

Дихання:
>60 / хвилину
Температура
тіла: 41°C

Дихання:
>75 / хвилину
Температура
тіла: 42°C

Дихання:
100 – 200 / хвилину
Температура
тіла: 44°C

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Бройлери



Постійно або під час
стресового періоду

Індики



Постійно або під час
стресового періоду

Несучка



Від початку і до
завершення піку
несучості та під час
стресового періоду

Батьківське
стадо



Постійно

ДОЗУВАННЯ:

1 кг/т за 10-14 днів до та впродовж усього спекотного періоду.

tekro

TEKRO.UA

0 800 503 112*

*дзвінки безкоштовні

ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?

НАПИШІТЬ НАМ:

order@tekro.ua