

## Якісна гігієна - і жодна комаха не проповзе!

- Інсектициди та ларвіциди для контролю мух, тарганів, бліх
- Засоби проти червоного курячого кліща
- Покрокові інструкції різних методів дезінсекції



tekro

Лінійка інсектицидів та ларвіцидів для боротьби з личинками, літаючими та повзучими комахами у тваринницьких приміщеннях




**ЦИРОМАТЕК** – це ларвіцид для боротьби з личинками мух у гною та інших місцях розмноження. Препарат перериває життєвий цикл мух, блокуючи формування кутикули личинок. У результаті личинки припиняють ріст та гинуть.

**ФОРМА ВИПУСКУ:** водорозчинні гранули.

**ДІЮЧА РЕЧОВИНА:** циромазин 2%.

### ПЕРЕВАГИ

- Перериває цикл розвитку мух та інших двокрилих
- Працює саме там, де розвиваються личинки
- Висока ефективність проти ранніх стадій розвитку комах
- Гнучкі методи застосування: сухе нанесення, обприскування, полив
- Тривалий контроль популяції комах



### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

Препарат застосовують безпосередньо у місцях розмноження комах.

- **Сухе внесення:** 500 г препарату на 20 м<sup>2</sup>
- **Обприскування:** 500 г препарату + 5 л води / норма витрати: 20 м<sup>2</sup>
- **Полив:** 500 г препарату + 15 л води

**Середня норма:** 25 г препарату на 1 м<sup>2</sup> / 1 кг на 40 м<sup>2</sup>

Для стабільного контролю популяції комах препарат застосовують кожні **2–3 тижні** протягом періоду до **2 місяців**.

**ЦИРОМАТЕК не діє на личинки від 2-ї до 3-ї стадії, лялечок та дорослих комах (імаго)**



Sharda Cropchem España S.L.

# СОДЖЕТ ВГ

**СОДЖЕТ ВГ** - професійне та дієве рішення для знищення мух, тарганів, бліх та інших комах у тваринницьких приміщеннях та пташниках.

**ФОРМА ВИПУСКУ:** гранули.

**ДІЮЧА РЕЧОВИНА:**  
імідаклоприд 100 г (10 %).

### ПЕРЕВАГИ

- Тривалий ефект від 4 до 6 тижнів
- Безпечність для людей та тварин
- Містить феромони для приваблення комах
- Висока активність: має 2 типи дії, контактну та кишкову



### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

**МЕТОД РОЗПИЛЕННЯ:** готують робочий розчин із розрахунку 500 г препарату на 4 л води та перемішують до повного розчинення, розрахований для обробки 1000 м<sup>2</sup> площі. Спочатку визначають робочу площу для обробки, потім розраховують оптимальну кількість робочої суспензії. Дезінсекцію проводять шляхом вибіркового обприскування не менше 30% поверхні стін, підлоги та стелі. Для обприскування використовують обприскувачі, які забезпечують формування крупного або конусного гідроаерозолу. Наносять розчин при низькому тиску не вище 20 МПа. Недоступні для обприскування місця обробляють малярними щітками або валиками.

**МЕТОД НАНЕСЕННЯ ЩІТКАМИ АБО ВАЛИКАМИ:** готують робочий розчин із розрахунку 50 г препарату на 1/4 л води і ретельно перемішують для одержання однорідної суспензії. Рочин розрахований для обробки 100 м<sup>2</sup> площ. Наносять цю суспензію вузькими смугами до 15 см шириною на поверхню де скупчуються мухи.

Починають проводити дезінсекцію на початку сезону льоту мух.

### НОРМА ВИТРАТ ПРЕПАРАТУ СОДЖЕТ ВГ

Спосіб застосування	Доза препарату	Площа оброблювального об'єкта
Звичайний (метод розпилення)	500 г на 4 л води/ на 1000 м <sup>2</sup>	1 кг препарату на 2000 м <sup>2</sup>
Звичайний (метод нанесення щітками або валиками)	50 г на 250 мл води/ на 100 м <sup>2</sup>	1 кг препарату на 2000 м <sup>2</sup>
Спеціальний у важких умовах* (метод розпилення)	500 г на 4 л води/ на 500 м <sup>2</sup>	1 кг препарату на 1000 м <sup>2</sup>
Спеціальний у важких умовах* (метод нанесення щітками або валиками)	100 г на 250 мл води/ на 100 м <sup>2</sup>	1 кг препарату на 1000 м <sup>2</sup>

\* використовується на господарствах при надмірній кількості мух, коли дезінсекція проводиться несистематично.



## СОФАСТ ГР



Sharda Cropchem España S.L.

**СОФАСТ ГР** - швидке та зручне рішення для знищення мух, тарганів, бліх, та інших комах у тваринницьких приміщеннях і пташниках.

**ФОРМА ВИПУСКУ:** гранули

**ДИЮЧА РЕЧОВИНА:**  
імідаклоприд - 5 г (0,5%).

### ПЕРЕВАГИ

- Тривалість дії від 2 до 6 тижнів
- Зручність, не потребує спеціального обладнання
- Безпечність для людей та тварин
- Приваблює комах



### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

**МЕТОД ОБПРИСКУВАННЯ:** розчин наносять за допомогою помпи: розводять 100 г препарату **СОФАСТ ГР** у 100 мл води. Добре перемішують до повного розчинення і витримують щонайменше 15 хв. Розпилюють робочий розчин за допомогою помпи з низьким тиском на непористі поверхні, де переважно скупчуються комахи. Рекомендується використати розчин упродовж 7-8 год після його приготування.

**МЕТОД НАНЕСЕННЯ ЩІТКАМИ:** розчиняють 200 г препарату у 150 мл води. Добре перемішують і настоюють щонайменше 20 хв. Наносять робочий розчин щітками на непористі поверхні, де переважно скупчуються комахи. Якщо процес обробки поверхонь переривався більше як на 30 хв, то перед наступним застосуванням суспензію слід перемішати. Забороняється обробка кормушок, поїлок і безпосередньо тих об'єктів з якими буде контактувати тварина. Використовують розчин впродовж 7-8 год після його приготування.

### НОРМА ВИТРАТ ПРЕПАРАТУ СОФАСТ ГР

Спосіб застосування	Доза препарату	Площа оброблювального об'єкта
Метод обприскування	100 г на 100 мл води / на 50 м <sup>2</sup>	1 кг препарату на 500 м <sup>2</sup>
Метод нанесення щітками	200 г на 150 мл води / на 100 м <sup>2</sup>	1 кг препарату на 500 м <sup>2</sup>

**ПЕРІОД ВИКОРИСТАННЯ:** з квітня до вересня.

**РЕКОМЕНДАЦІЯ:** Для максимального знищення популяції мух рекомендуємо проводити комплексну обробку за схемою:  
**ЦИРОМАТЕК / КОНЦЕНТРАТ М + СОДЖЕТ ВГ/СОФАСТ ГР**



Sharda Cropchem España S.L.


СОФАСТ ГР



**РЕКОМЕНДАЦІЯ:** для отримання кращого результату рекомендуємо змочувати місця нанесення робочого розчину водою кожен день.

Для максимального знищення популяції мух рекомендуємо проводити комплексну обробку за схемою: **ЦИРОМАТЕК / КОНЦЕНТРАТ М + СОДЖЕТ ВГ/СОФАСТ ГР**

### ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОФАСТ ГР ПРОТИ МУХ У ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ (СВИНАРНИКАХ) З ПОГАНИМ САНІТАРНИМ СТАНОМ.



До застосування препарату, кількість мух у приміщенні: > 60 мух/тварину

При проведенні експериментальних досліджень щодо ефективності використання препарату **СОФАСТ ГР** у свинарнику з поганим санітарним станом було встановлено, що після його застосування вже на 1 тиждень виявлено тенденційне зниження кількості мух, відповідно на 40%, через 14 днів – кількість мух зменшилась на 65%, на 3 тиждень – на 70%, а на 4 тиждень – зазначали найбільший ефект – 83%.

Звертаємо увагу, що для досягнення кращого ефекту дезінсекції, місця, де наносили препарат **СОФАСТ ГР** щоденно зволожували, з метою активації феромону для більшого приваблення мух.





## АЛЬФАСЕКТ КС



Sharda Cropchem España S.L.

**АЛЬФАСЕКТ КС** - концентрована інсектицидна суспензія для знищення паразитичних комах, в тому числі червоних курячих кліщів (*Dermanysus gallinae*).

**ФОРМА ВИПУСКУ:** суспензія, концентрат.

**ДІЮЧА РЕЧОВИНА:**  
Альфациперметрин – 60 г (5,93%).

### ПЕРЕВАГИ

- Знищує широкий спектр паразитів: комарів, гедзів, мошок мокреців, москітів, молі, тарганів, клопів, мурах, а також жуків шкіроїдів
- Має інсектицидну та репелентну дію
- Препарат є активним у дуже малих дозах
- Тривала активність: діє до 8 тижнів



### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

**МЕТОД ЗВИЧАЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ:** застосовують для звичайної обробки проти повзучих і літаючих комах, жуків шкіроїдів, курячих кліщів.

**МЕТОД СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ:** застосовують для екстремальної обробки дуже забруднених поверхонь.

### НОРМА ВИТРАТ ПРЕПАРАТУ АЛЬФАСЕКТ КС

Спосіб застосування	Доза препарату	Площа оброблювального об'єкта
Метод звичайного застосування	25 мл на 5 л води	5 л робочого розчину на 100 м <sup>2</sup>
Метод спеціального застосування	50 мл на 5 л води	5 л робочого розчину на 100 м <sup>2</sup>

### ПРИ БОРОТЬБІ З ЧЕРВОНИМ КУРЯЧИМ КЛІЩЕМ

Рекомендується дезінсекція пташника перед посадкою птиці, ефективніше робити це після дезінфекції. Особливу увагу при обробці пташника від червоних кліщів слід приділяти важкодоступним місцям, а також усім поверхням клітки, гніздам, жердинам, під лентами збору яєць, по кутах, а також усіх щілинах та місцях, де можуть переховуватися кліщі.



## ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ДЕЗІНСЕКЦІЇ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Назва препарату	Діюча речовина, %	Ціна, з ПДВ
Соджет	Імідаклоприд 100 г (10%)	
Софаст	Імідаклоприд 5 г (0,5%)	
Альфасект	Альфациперметрин 60 г (5.93 +)	
Цироматек	Циромазин, 20 г (2%)	

**ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ**  
для боротьби з личинками,  
літаючими та повзучими комахами

**ТЕКРО**- коли є результат!

Скануй та приєднуйся до груп



**Вирощування  
телят**



**Здорова  
корова**



**ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?**  
**НАПИШІТЬ НАМ:**  
[order@tekro.ua](mailto:order@tekro.ua)

**ТЕКРО.UA**

**0 800 503 112\***

\*дзвінки безкоштовні