



TekroMilk



**Суворий
лабораторний
контроль на
виробництві**



**Висока
поживність**



**Відмінна
засвоюваність**

TekroMilk:

**інвестуй у старт — отримуй
бонуси на фініші!**

tekro



ТЕКРОМІЛК - лінійка професійних замінників молока, що забезпечує швидкий ріст, міцне здоров'я та стабільну імунну систему телят

ОБЕРІТЬ СВІЙ ПРОДУКТ ІЗ ЛІНІЙКИ TEKROMILK:

з 4-го дня життя
TekroMilk PremiBOV*

з 7-го дня життя
TekroMilk GrandBOV

з 21-го дня життя
TekroMilk OptiBOV

ЛИШЕ
МОЛОЧНІ
БІЛКИ!



* виготовлений на основі сировини компанії LEMASA, лідера на ринку молокозамінників Іспанії.

7 ТОП - ХАРАКТЕРИСТИК ЗАМІННИКІВ МОЛОКА ЛІНІЙКИ TEKROMILK

1. Високий вміст якісного білка – приблизно 20–22% протеїну ► достатня кількість амінокислот для росту та розвитку, при чому в якості джерела білка – легкозасвоювані молочні білки.

2. Оптимальний рівень енергії (жиру) – до 20% молочних жирів ► забезпечує енергію для росту теляти. Тваринний жир представлений в дрібнодисперсній інкапсульованій формі.

3. Підібраний склад інгредієнтів з високим вмістом молочних компонентів, без наповнювачів низької якості та небажаного великого обсягу рослинних білків.

4. Добра розчинність і легке змішування ► стабільна консистенція та рівномірне годування.

5. Збалансовані вітаміни та мінерали ► TekroMilk має всі важливі мікроелементи (кальцій, фосфор) та вітаміни (A, D, E та інші) для підтримки імунної системи, кісток і обміну речовин.

6. Добра перетравність ► формула розроблена так, щоб бути легкою для засвоєння й мінімізувати розлади шлунково-кишкового тракту.

7. Відповідність фізіології телят – продукти адаптовані під вікові потреби телят, склад відповідає цілям вирощування на певному етапі.

ПОРІВНЯННЯ РОСТУ ТЕЛЯТ: МОЛОКО ТА ЯКІСНИЙ ЗАМІННИК МОЛОКА*

Показник	Цільне молоко	Замінник молока
Середня вага телят у 56 днів (кг)	75,5	81,5
Середня вага телят у 70 днів (кг)	85,8	91,5
Середній загальний приріст ваги (кг)	47,7	55,4

+16%
приросту!

* Результати польових досліджень у господарствах

Agriculture and food development authority | <https://teagasc.ie/wp-content/uploads/2025/05/Segment-004-of-Section3-Milk-feeding.pdf>

ЯК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТУВАТИ РОЗЧИН ЗЦМ



1. Підготуй інгредієнти й обладнання

- Візьми чисті відро/мішалку, термометр, ваги або мірну чашу.
- Переконайся, що посуд чистий та сухий — це важливо для гігієни й рівномірного змішування.



2. Нагрій воду до ~55 °C

- Відбери половину об'єму води від потрібної кількості.



3. Зваж потрібну кількість TekroMilk з розрахунку 125 г на 1 л води

- Краще зважити, а не «черпати» — це дає правильну концентрацію.



4. Додай TekroMilk у теплу воду, перемішай до однорідності

- Насипай молочний порошок у воду, а не навпаки — так уникнеш грудочок.
- Перемішуй до повного розчинення без залишків на дні або грудочок у розчині.



5. Додай другу половину води та перевір температуру перед годуванням

- Після змішування температура повинна бути близько 38 °C (≈ температура тіла теляти).
- Якщо розчин охолов, підігрій до потрібної температури перед випоюванням.

СХЕМА ВИПОЮВАННЯ ТЕЛЯТ ЗЦМ

День	Кількість ЗЦМ (г/день)	К-ть готового розчину, л	К-ть прийомів на день	К-ть концентратів на день	К-ть сіна (силосу) на день
1 - 4	Молозиво / молоко	мах кількість материнського молока (молозива)/ привчання до соски	3 - 4	---	---
5 - 10	Поступовий перехід з цільного молока на ЗЦМ, збільшуючи частку останнього до 750 г/день	6	3	Вволю (фактичне споживання 50-100 г/день, ознайомлення)	---
10 - 30	750 – 1125 г/день	6 - 9	3	Вволю (фактичне споживання 100-500 г/день)	Привчання до сіна
30 – 40	1125 г/день	9	3	Вволю (фактичне споживання 500-1000 г/день)	Вволю сіна
40 – 50	Перехід з триразового на дворазове годування 1125 – 750 г/день	9 - 6	3 – 2	Вволю (фактичне споживання 800-1000 г/день)	Вволю сіна, привчання до ЗЗР*
50 – 60	Повне відлучення від ЗЦМ (при споживанні комбікорму 1,5 - 2 кг/день) 750 – 0 г/день	6 - 0	2: При переведенні на 1-денні випоювання краще проводити його ввечері для стимуляції споживання престартеру.	Вволю (фактичне споживання 1000-3000 г/день)	Вволю сіна, вволю силосу, привчання до ЗЗР

* З 2-го дня чиста вода має бути в постійному доступі, якщо випоювання відбувається з соски Milk Bar. При випоюванні з відра, відра з водою прибираються за годину до випоювання молоком.

* Для зменшення стрес факторів унікаємо перегрупування телят. Престартерний комбікорм залишаємо вволю (приблизно ще на місяць) до повного привчання тварин до ЗЗР.

* ЗЗР - загальнозмішаний раціон

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ



- 1. Чи є різниця в рості телят, вирощених із заміником молока та цільним молоком?**

Так, але якщо заміник молока правильно виготовлений із якісних інгредієнтів і годується за інструкцією, телята можуть рости так само добре, як і на цільному молоці. Деякі дослідження навіть показали кращі результати з високоякісним ЗЦМ.



- 2. Скільки заміника молока слід давати телятам?**

За рекомендаціями, теля має отримувати не менше 13-15% своєї ваги при народженні у вигляді заміника молока (розчину).



- 3. Коли можна починати давати заміник молока?**

Заміник молока можна пропонувати одразу після випоювання необхідної кількості молозива та в залежності з рекомендаціями, щодо конкретного заміника.



- 4. Які переваги годівлі заміником молока порівняно із цільним молоком?**

До плюсів належать: гнучкість у годівлі, можливість годувати поза місцем доїння, збалансований та якісний склад раціону, регулярність і менша залежність від зміни обсягів молока, уникнення зараження інфекціями, порівняно із згодовуванням непастеризованого молока.



- 5. А які недоліки годівлі заміником молока?**


Недоліки включають: необхідність ретельного планування, можливі витрати часу на змішування, різноманітність продуктів на ринку та витрати на сам заміник.



- 6. Чи потрібно коригувати годівлю, якщо теля слабке?**

Так: слабким телятам рекомендується поступово збільшувати обсяг молока впродовж перших 24-48 годин, починаючи з менших порцій кілька разів на день: по 250 мл 5 разів на день, поступово збільшуючи споживання до 2 л двічі на день.

СХЕМИ АДАПТАЦІЇ ГОДІВЛІ ПІД ЧАС НЕСПРИЯТЛИВИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ



Холод – це стрес для телят, вони витрачають енергію на зігрівання замість росту. Сигнал проблеми — тремтіння теляти після годування. Щоб уникнути цього і підтримати ріст, збільшуй порцію замітника молока на 2% на кожен градус, що нижче 10°C.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА В ЗАМІННИКУ МОЛОКА ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

Температура повітря	Теля 50 кг (< 3 тижнів)	Теля 50 кг (> 3 тижнів)	Теля 75 кг
20 °C	0 л	0 л	0 л
10 °C	0.9 л	0 л	0 л
0 °C	1.8 л	0.9 л	0 л
-10 °C	2.7 л	1.8 л	1.4 л
< -10 °C	—	—	2.7 л



TEKRO.UA

0 800 503 112*

*дзвінки безкоштовні

ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?

НАПИШІТЬ НАМ: order@tekro.ua

СКАНУЙ!



Доєднайся до групи
“Вирощування телят”